



بیمارستان و دارالشفای حضرت زهرا (س) مرضیه

قرص پلاویکس

تاریخ بازنگری: مهر ماه ۱۳۹۶



روزانه یک عدد قرص ۷۵ میلی گرمی مصرف می شود . در بعضی مواقع برحسب شرایط بیماری ممکن است این قرص همراه با قرص آسپرین برای اثر بهتر استفاده گردد که می توان همراه یا بدون غذا مصرف گردد .

توصیه هایی جهت تشخیص داروی اصل از

داروی تقلبی :

جعبه داروی شما محتوی ۲۸ عدد قرص ۷۵ میلی گرمی می باشد .

شماره درج شده بر روی جعبه را با شماره روی ورقه (کاغذ دارو) تطبیق دهید .

اگر دو شماره متفاوت مشاهده کردید از استفاده آن خودداری نموده و سریعاً جهت تعویض داروی خود اقدام کنید .

همواره داروی خود را از داروخانه های معتبر تهیه نمایید و به توصیه های پزشک خود در این زمینه عمل کرده و در صورت هرگونه ابهام با پزشک خود تماس بگیرید .

*کانال تلگرام بیمارستان :

@zahrayemarziye

اگر دچار بیماری هستید که شما را در معرض خطر خونریزی بیشتر قرار می دهد مانند زخم معده با پزشک خود مشورت کنید . در موارد آسیب های کلیوی و مشکلات کبدی پزشک خود را از مصرف این دارو آگاه کنید . خطر بروز خونریزی در صورت استفاده همزمان پلاویکس با برخی از داروها از جمله آسپرین ممکن است افزایش یابد . در مدت زمانی که شما از این دارو استفاده می کنید لازم است که با نظر پزشک خود آزمایشات خاصی مخصوصاً فرمول شمارش خون و پلاکت را به طور منظم انجام دهید . عوارض ناخواسته نادر هستند ولی میتواند شامل خارش، جوش های پوستی ، اسهال و کبود شدن پوست باشد . این دارو به صورت قرص های ۷۵ میلی گرمی در بازار موجود می باشد که برای اولین بار در محیط بیمارستان ممکن است مقدار اولیه با ۳۰۰ میلی گرم شروع شود یعنی معادل (۴ قرص ۷۵ میلی گرمی) و روزهای بعد به صورت تک قرص و تنها

پلاویکس یک داروی ضد پلاکتی است که ثابت شده است خطر بروز مجدد سکته مغزی و حملات قلبی را کاهش می دهد. داروهای ضد پلاکت مانند پلاویکس برای جلوگیری از تشکیل لخته در عروق پا و یا داخل استنت (فنر) تعبیه شده مصرف می شوند تا خون به راحتی در رگ ها جریان یافته و اکسیژن را به اندام های حیاتی بدن مثل مغز و قلب برساند . پزشکان اغلب داروهای ضد پلاکت را برای بیمارانی که در معرض افزایش خطر ابتلا به حملات قلبی یا سکته مغزی در آینده هستند تجویز می کنند . همچنین این داروها در بیمارانی که آنژیوپلاستی شده اند مصرف می شود تا از انسداد ناگهانی آنها به دلیل بروز لخته و ترومبوز جلوگیری شود .

داروی پلاویکس مستقیماً باعث کاهش تشکیل لخته می گردد . در صورتی که داروهای کاهش دهنده فشار خون و کلاسترول این کار را انجام نمی دهند بنابراین برای اطمینان از محافظت مداوم شما در برابر حملات قلبی و سکته مغزی در

آینده ، مصرف داروی پلاویکس که توسط پزشک تجویز شده است بسیار مهم می باشد . ممکن است پزشک به منظور محافظت بیشتر شما علاوه بر سایر انواع داروها از جمله (آسپیرین) پلاویکس نیز تجویز کند . اگر شما به علت درد قفسه سینه یا گرفتگی رگ های خون رسان قلب در بیمارستان بستری شده اید و یا تحت آنژیوپلاستی عروق قلبی قرار گرفته اید همزمان مصرف پلاویکس و آسپیرین با هم نسبت به آسپیرین تنها محافظت بهتری در برابر حملات قلبی و سکته مغزی و احتمال ایجاد مجدد لخته در داخل رگ گرفتار و یا استنت (فنر) دارد .

ادامه مصرف پلاویکس تا مدت مشخص شده توسط پزشک بسیار حائز اهمیت است . چون قطع زودتر از موعد دارو میتواند سبب ایجاد لخته و گرفتگی در رگ های قلبی یا رگ های مغز و بروز سکته قلبی یا سکته مغز می گردد .

احتیاط های مصرف دارو :

بهتر است در مورد ادامه مصرف دارو بیش از مدت زمان ۱ ماه بعد از حمله حاد گرفتگی رگ های خون رسان قلب یا درد قلبی ناپایدار با پزشک مشورت کنید . در بیمارانی که آنژیوپلاستی رگ های قلبی داشته اند مدت زمان داروی پلاویکس براساس نوع استنت (فنر) فرق می کند . بیمارانی که برای آنها از استنت دارویی (فنر دارویی) استفاده شده است لازم است که مدت طولانی تری از این دارو استفاده نمایند . که این مدت حداقل ۶ ماه تا ۱ سال است و در بیمارانی که از استنت غیر دارویی (فنر غیر دارویی) استفاده شده است بهتر است حداقل مدت ۱ ماه از این دارو استفاده نمایند برای تنظیم میزان مصرف دارویی خود و ایجاد تغییرات لازم در نحوه زندگی با پزشک مشورت کنید . پلاویکس به طور گسترده ای مورد مصرف قرار گرفته است و عموماً دارویی بی خطر بود و به خوبی تحمل می شود .