



بیمارستان و دارالشفای حضرت زهرا (س)

دیسترس تنفسی نوزاد (TTN)

تاریخ بازنگری : دی ماه ۱۳۹۷



درمان :

درمان بیماری شامل تجویز آنتی بیوتیک اقدامات حمایتی و رساندن اکسیژن به نوزاد است .



*کانال تلگرام بیمارستان :
@zahrayemarziye

- این اختلال می تواند در نوزادان نارس دچار سندرم دیسترس تنفسی و در نوزادان بالغ که مایع آمنیوتیک مکونیومی (مایع داخل رحمی آغشته به مدفوع نوزاد) داشته اند رخ دهد.
- بیماریهای تنفسی نوزادان مخصوصاً سندرم زجر تنفسی RDS در جنس پسر و در متولدین سزارین انتخابی بیش از متولدین سزارین اورژانسی و زایمان طبیعی دیده می شود.

تاکی پنه به تعداد تنفس بیشتر از مقادیر نرمال گفته می شود . تاکی پنه گذرای نوزادی یا TTN به دیسترس تنفسی گذرا در نوزادان ترم (رسیده) یا نزدیک به ترم گفته می شود که خود را به صورت تنفس های تند و مشکل و گاه ها همراه با زاری و کبودی پوست نوزاد نشان می دهد . این بیماری بیشتر در نوزادان ترم و نزدیک به ترمی دیده می شود که با زایمان سریع و یا عمل سزارین متولد می شوند .

و یا مادران مبتلا به دیابت دارند. تنفس مشکل این نوزادان بعلت احتباس مایع در ریه ها می باشد که مانع از تهویه مناسب هوا در ریه ها می شود .

چه نوزادانی مبتلا می شوند :

- نوزادان نارس
- نوزادان بالغی که به طریق سزارین متولد شده اند .



- نوزادانی که با دپرسیون تنفسی متولد شده اند .
- همه نوزادانی که در پاکسازی مایع از ریه دچار مشکل بوده اند .



عوامل خطر :

- آسم و دیابت مادر