



بیمارستان و دارالشفای حضرت زهرا (س) مرضیه (س)

ختنه و مراقبت های آن

تاریخ بازنگری: مهر ماه ۱۳۹۶



- کاپ ختنه (حلقه) از ۳ روز تا ۱۰ روز بعد جدا می شود. از دستکاری آن خودداری کنید و در صورت جدا نشدن به مرکز مراجعه کنید.
- پانسمان اولیه را در صورت خیس بودن بردارید و دیگر نیاز به پانسمان ندارد. فقط محل مربوطه را با بتادین شسته و با پماد تتراسیکلین چرب نمایید.
- از پوشک و قنداق کردن کودک در ۳ روز اول خودداری نمایید و محل ختنه کاملا باز باشد. (از پوششی شبیه به دامن استفاده نمایید).
- کودک را حداقل به مدت یک هفته

تا زمانی که پوست بهبود می یابد در وان حمام قرار ندهید.

در صورتی که هر کدام از موارد زیر اتفاق افتاد به بیمارستان مراجعه

نمایید:

- وجود خونریزی یا ترشح از آلت
 - کودک به طور طبیعی طی ۶ تا ۸ ساعت ادرار نکند.
 - تغییر رنگ سر آلت به رنگ آبی یا سیاه
 - تب بالا که همراه با مشکلات محل ختنه باشد
 - بوی نامطبوع یا ترشح زرد رنگ از سر آلت
 - هر گونه تورم یا قرمزی در اطراف نوک آلت که پس از ۳ روز بدتر شود.
- *کانال تلگرام بیمارستان:
@zahrayemarziye

ختنه چیست؟

ختنه نوعی عمل جراحی برداشتن پوست انتهایی آلت تناسلی می باشد .

روش انجام ختنه در این مرکز به**چه صورتی می باشد ؟**

در این مرکز ختنه همزمان با گذاشتن حلقه و برش پوستی انجام می شود .

ختنه هیچ دو کودکی شبیه به هم نیست لذا مقدار برداشتن پوست اضافی در هر موردی خاص همان فرد است .

ختنه در چه صورتی انجام نمی**شود؟**

در صورت وجود زردی و تب و علائم سرما خوردگی وانجام واکسیناسیون انجام ختنه صلاح نیست .

اقدامات ضروری پس از انجام ختنه**چیست؟**

- در ۳ ساعت اول بعد از ختنه هر ۳۰ دقیقه یکبار محل ختنه را از نظر خونریزی چک کنید و در نیم ساعت اول پس از ختنه حتما در محل حضور داشته باشید .

- کودک شما ظرف مدت ۶ ساعت

پس از ختنه باید ادرار کند .

- احتمال ضعیف شدن و جریان ادرار و پخش شدن ادرار در طی ۲ ساعت اول به علت تنگی نوک مجرای ادرار وجود دارد .

- بعد از هر بار ادرار کردن محل را با آب ولرم و شامپو بچه شستشو دهید . این کار را به آرامی انجام دهید چون ممکن است دردناک باشد .

- پس از ۲ روز کودک خود را حمام کنید تا زمانیکه آلت کودک بهبود نیافته از به کار بردن صابون ، لوسیون ، پودر و دستمال مرطوب اجتناب کنید .