




بیمارستان و دارالشفای حضرت زهرا (س) مرضیه (س)

## آنژیوگرافی

تاریخ بازنگری: مهر ماه ۱۳۹۶



♦ از مصرف دخانیات و مشروبات الکلی اجتناب کنید.


♦ در صورت بروز درد یا کبودی در محل آنژیوگرافی از کیسه آب گرم یا حوله گرم استفاده نمایید.

♦ در صورت داشتن علائم زیر پزشک یا پرستار را در جریان قرار دهید:

⇐ درد قفسه سینه

⇐ درد یا بی حسی در پا یا بازو (ناحیه عمل)

⇐ سرد شدن، کبودی و یا آبی رنگ شدن بازو و پا در ناحیه عمل



**منبع:** کتاب پرستاری داخلی جراحی برون-سودارت (قلب و عروق) - ۲۰۱۰

\*کانال تلگرام بیمارستان : @zahrayemarziye

## اقدامات بعد از انجام آنژیوگرافی:

♦ پس از اتمام کار کاتتر برداشته می شود و در محل آن یک پانسمان فشرده و محکم جهت جلوگیری از خونریزی گذاشته می شود.

♦ یک کیسه شن در ناحیه عمل جهت جلوگیری از خونریزی قرار داده می شود.

♦ استفاده از مایعات به مقدار زیاد جهت دفع بهتر ماده رنگی توصیه می شود.

♦ جهت جلوگیری از خونریزی، برای چندین ساعت باید به پشت بخوابید.

♦ ۶ ساعت پس از آنژیوگرافی نباید از تخت خارج شوید.

♦ برای ۲۴ ساعت از خم نمودن اندام مورد نظر و رانندگی اجتناب کنید.

♦ دوش گرفتن کوتاه مدت در شرایط کم بخار مانعی ندارد.

♦ داروهای خود را طبق دستور قبلی پزشک به مصرف برسانید.

♦ پیاده روی را در برنامه روزانه خود بگنجانید.

## آنژیوگرافی چیست؟

به معنی عکسبرداری از رگ های خونی قلب با استفاده از تزریق یک ماده رنگی (حاجب) می باشد. با این روش پزشک از گرفتگی یا عدم گرفتگی سرخرگ های کرونر قلب آگاهی می یابد.

## روش انجام کار:

برای انجام نیازی به بیهوشی نیست گاهی قبل از شروع کار یک آرام بخش به شما داده می شود برای شروع یک ناحیه از بدن شما ، معمولاً بازو یا کشاله ران تمیز شده و با یک بی حس کننده موضعی بی حس می شود. در این ناحیه یک مسیر وریدی گرفته می شود و از طریق این رگ لوله ای باریک و توخالی به نام کاتتر توسط پزشک به سرخرگ های قلب هدایت می شود. پزشک نوک کاتتر را از روی مانیتور رادیوگرافی مشاهده کرده و آن را هدایت می کند. هنگامی که کاتتر در محل مورد نظر قرار گرفت ماده حاجب تزریق می شود و از این جریان فیلم های متعدد گرفته می شود. طول مدت آنژیوگرافی بسته به شریان مورد بررسی ممکن است تا یک ساعت طول بکشد.

## اقدامات قبل از انجام آنژیوگرافی:

♦ در صورت مصرف داروهای ضد انعقادی مانند وارفارین از سه تا چهار روز قبل مصرف دارو را متوقف کنید.

♦ جواب آزمایش خون ،نوار قلب و عکس سینه را یک روز قبل از آنژیوگرافی به بخش مربوطه تحویل دهید تا برای شما پرونده تشکیل شود.

♦ گاهی اوقات شب قبل از انجام آنژیوگرافی در بیمارستان بستری می شوید در غیر اینصورت معاینه پزشکی در همان روز قبل از شروع کار انجام می پذیرد.

♦ در صورت حساسیت به غذاهای دریایی مثل میگو و ماهی یا حساسیت به مواد حاجب در گذشته پزشک را در جریان قرار دهید.


♦ از خوردن و آشامیدن به مدت ۸ ساعت قبل از آنژیوگرافی خودداری کنید.

♦ یک روز قبل از آنژیوگرافی به حمام بروید و موهای زائد کشاله ران ، قفسه سینه و ناحیه زیر بغل را بتراشید.

♦ اگر باردار هستید پزشک را مطلع سازید.

♦ از کاربرد لوازم آرایشی خودداری نمایید.

♦ زمان مراجعه از پوشیدن زیورآلات و دندان مصنوعی خودداری کنید و یک نفر همراه داشته باشید.



## عوارض:

\*بی نظمی ضربان قلب که معمولاً گذرا بوده و بدون نیاز به دارو برطرف می شود..

\*حساسیت به داروی حاجب (ماده رنگی)، امروزه با استفاده از داروهای جدید این عارضه به ندرت دیده می شود.

\*خونریزی ، این عارضه نیز شایع نمی باشد.

\*تشکیل لخته در خون که منجر به ایجاد سکنه قلبی و مغزی می شود.

\*عفونت ، این عارضه نیز با استفاده از وسایل تشخیصی

جدید نادر می باشد.