



بیمارستان و دارالشفای حضرت زهرا (س) مرضیه (س)

بیوپسی مغز استخوان

تاریخ بازنگری: مهر ماه ۱۳۹۶



پس از خاتمه نمونه گیری ، سوزن خارج شده و به منظور پیشگیری از خونریزی تا چند دقیقه بر روی محل نمونه گیری فشار وارد خواهد شد . در نهایت ناحیه نمونه گیری پانسمان خواهد شد .

پس از آزمون :

- به شما توصیه می شود برای چند ساعت در بستر استراحت کنید .
- در صورت بروز خونریزی که لایه های پانسمان را کاملاً خیس کرده و یا بیشتر از ۲۴ ساعت ادامه یابد فوراً به مراقب بهداشتی خود اطلاع دهید .
- در صورتی که احساس ناراحتی و درد کنید برای شما مسکن تجویز خواهد شد .

*کانال تلگرام بیمارستان :

@zahrayemarziye

سوزن بیوپسی از طریق پوست و لایه های زیرین آن به داخل استخوان هدایت می شود . سپس قسمت میانی سوزن برداشته شده و سوزن به صورت مستقیم و چرخشی به سمت جلو رانده می شود . مقدار کمی از مغز استخوان داخل سوزن باقی می ماند زمان جمع آوری نمونه مغز استخوان شما درد مختصر و تیزی را در استخوان خود احساس می کنید .



بیمار عزیز :

این آزمون بافت نرم استخوان یا مغز استخوان شما را مورد بررسی قرار می دهد . در یک بیوپسی آسپیراسیون نمونه مایع مانندی شامل قسمت هایی از مغز استخوان توسط یک سوزن بیوپسی برداشته می شود . این کار ۲۰-۱۰ دقیقه به طول می انجامد.

نمونه مغز استخوان در زیر یک میکروسکوپ از نظر تعداد ، شکل و اندازه سلول های خون ساز مورد بررسی قرار می گیرد. شما حدوداً ۱ تا ۲ هفته بعد از نتایج آن آگاه خواهید شد .

قبل از آزمون :

- معمولاً نیازی به ناشتا بودن نیست ، اما توصیه می شود قبل از آزمون غذای سبک استفاده کنید .

- یک نمونه خون ممکن است گرفته شود .

- شما ممکن است یک ساعت قبل از آزمون ، آرام بخش دریافت کنید . این کار به حفظ آرامش شما کمک خواهد کرد.

حین انجام آزمون :

اغلب بیوپسی از استخوان لگن انجام میشود . سایر مناطق مورد استفاده ستون فقرات ، استخوان پا یا سینه است . زمانی

که نمونه مغز استخوان از قسمت پشتی پشتی استخوان لگن تهیه می شود از شما خواسته می شود که بر روی شکم خوابیده و بی حرکت بمانید. سپس پوست اطراف محل نمونه گیری را تمیز و توسط یک ماده ضدعفونی کننده کاملاً ضدعفونی می شود . به منظور کاهش ناراحتی شما در حین فرو بردن سوزن بیوپسی در ناحیه از یک ماده بی حس کننده استفاده می شود .

نحوه انجام بیوپسی :

بعد از ضد عفونی محل ، بی حسی موضعی تزریق می گردد و بعداً یک