



بیمارستان و دارالشفای حضرت زهرا (س) مرضیه (س)

سرکلاژ چیست؟

تاریخ بازنگری: مهر ماه ۱۳۹۶



- پارگی دهانه رحم یا خود رحم
- ناتوانی دهانه رحم در کوتاه یا باز شدن
- تنگی گردن رحم
- مجرای غیر طبیعی بین مثانه و واژن (فیستول مثانه)
- تب
- شل شدن بخیه
- سقط جنین

هشدارها:

۱- اگر عمل سرکلاژ را انجام دادید، به محض مشاهده نشت مایع از واژن خود، فوراً پزشک متخصص زنان مراجعه کنید، زیرا ممکن است علامتی از پارگی زودرس کیسه آب جنین باشد.

۲- فعالیت های شدید خود را در طی روز کاهش دهید تا انقباضات رحمی و مشکلات بعدی برایتان ایجاد نشود. نقش استراحت در این زمینه آنقدر مهم است که حتی برای زنانی که با مشکل نارسایی دهانه رحم روبرو هستند و نمی توانند عمل سرکلاژ را انجام دهند، استراحت زیاد به آن ها توصیه می شود.

*کانال تلگرام بیمارستان: @zahrayemarziye

فواید سرکلاژ:

۱. افزایش مدت زمانی که زن باردار بتواند جنین را در رحم خود نگه دارد.
۲. جلوگیری از زایمان زودرس
۳. کاهش میزان سقط جنین
۴. افزایش احتمال به دنیا آمدن نوزاد سالم و کامل

عوارض سرکلاژ:

اگرچه این عمل برای برخی افراد لازم می باشد، اما همان طور که می دانید انجام هر عمل جراحی عوارضی دارد که بیمار باید از آنها مطلع باشد.

عوارض احتمالی عمل سرکلاژ شامل موارد زیر می باشد:

- زایمان زودرس
- عفونت داخل رحمی
- پارگی زودرس کیسه آب جنین
- پرولاپس و یا افتادگی کیسه آب جنین
- عفونت
- انقباضات رحم
- خونریزی واژینال

دوختن دهانه رحم در زنان باردار

یکی از عمل های جراحی که در برخی زنان باردار انجام می شود ، سرکلاژ (Cerclage) یا دوختن دهانه رحم می باشد ، زیرا این زنان به علت داشتن مشکلاتی در ناحیه رحم ، قادر به نگه داشتن جنین خود نیستند و ممکن است با افزایش وزن جنین ، دهانه رحم آن ها باز شود و جنین خود را از دست بدهند .

در زنانی که دچار نارسایی دهانه رحم هستند ، قسمت انتهایی رحم آنها که به واژن ختم می شود ، با استفاده از بخیه دوخته می شود تا با بسته شدن دهانه رحم ، از تولد نوزاد نارس جلوگیری شود . هنگامی که رشد نوزاد کامل شد ، حدودا در هفته ۳۷ بارداری ، این بخیه ها کشیده می شوند و معمولا تا قبل از تولد نوزاد از بین می روند . اگر پزشک متخصص زنان تشخیص دهد که دهانه رحم زن بارداری در معرض خطر بازشدن است ، باید این عمل را انجام داد . معمولا اولین جنینی که به علت این مشکل سقط می شود ، سن حاملگی بالاتری نسبت به جنین های بعدی دارد ، یعنی در هر بار حاملگی وضع بدتر می شود .

چرا سرکلاژ انجام می گیرد؟

قبل از بارداری ، دهانه رحم در زنان حالت سفت و محکمی دارد . در اواخر بارداری سفتی دهانه رحم کاهش می یابد تا شرایطی فراهم شود که دهانه رحم حین زایمان باز شود و نوزاد به دنیا بیاید .

حال اگر در طول حاملگی ، دهانه رحم ضعیف و شل باشد ، فرد در معرض سقط جنین و یا زایمان زودرس قرار می گیرد . اگر پزشک متخصص زنان ، مشکلات زیر را در زن بارداری مشاهده کند ، برای او عمل سرکلاژ را پیشنهاد می دهد :

- اگر فرد بی دلیل زایمان زودرس داشته باشد و یا سابقه سقط جنین در سه ماهه دوم بارداری داشته باشد و یا دو سقط بی دلیل در سه ماهه دوم بارداری داشته باشد .

- اگر در سونوگرافی هفته ۲۰ تا ۲۴ بارداری ، مشاهده شود که طول گردن رحم در خانمی کوتاه است ، به خصوص اگر این خانم ، سابقه سقط جنین در سه ماهه دوم بارداری داشته باشد .

- اگر قبل از هفته ۲۴ بارداری ، اتساع (باز شدن) دهانه رحم در خانمی دیده شود . این مورد ، حالت اورژانسی برای انجام عمل سرکلاژ محسوب می شود ، زیرا در غیر این صورت ممکن است به از دست دادن جنین منجر شود .

- اگر فردی دچار سقط های مکرر شود و علی رغم استفاده از راه های درمانی و دارویی تحت نظر پزشک متخصص ، باز هم به سقط جنین مبتلا می شود ، انجام عمل سرکلاژ قبل از آمیزش برای او توصیه می شود . اگرچه انجام این عمل قبل از آمیزش ، قدرت باروری فرد را کاهش می دهد ، در این خصوص متخصص مربوطه با در نظر گرفتن شرایط بیمار و سقط های مکرر او ، تشخیص صحیح خود را خواهد داد .

