




بیمارستان و دارالشفای حضرت زهرا (س) مرضیه (س)

مراقبت از کاتتر دو جداره گردنی

تاریخ بازنگری: مهر ماه ۱۳۹۶




- به پیچ های سر لوله ها دست نزنید .
- در صورت مشاهده قرمزی ، التهاب ، خونریزی و ترشح زرد رنگ چرکی ، سریع به پزشک مراجعه کنید .
- هنگام باز نمودن و بستن سر کاتتر توسط پرستار حین و در پایان دیالیز ، حتماً جهت پیشگیری از انتقال عفونت از ماسک استفاده نمایید.



*کانال تلگرام بیمارستان : @zahrayemarziye

- در صورت احساس درد شدید در محل لوله ها و یا در قفسه سینه فوراً به پزشک مراجعه کنید .
- در صورت باز شدن بخیه ها و یا جابجایی لوله ها قبل از اقدام به هر کاری ، فوراً به پزشک مربوطه مراجعه کنید .
- در صورت بروز تب و لرز حتماً پزشک خود را مطلع نمایید .
- کلامپ قطع جریان خون که در هر دو شاخک لوله هاست به هیچ عنوان بازو بسته نگردد .



برای همودیالیز نمودن شما و خروج سموم از بدنتان نیاز به جریان خونی مناسب برای دستگاه دیالیز داریم و تا زمانی که بتوان از فیستول شما استفاده نمود می بایست بطور موقت از یک کاتتر یا لوله در شاخه ای که در یک سیاهرگ بزرگ مثلاً در گردن گذاشته می شود جهت دیالیز استفاده نماییم . لذا جهت پیشگیری از عوارضی مانند عفونت ، خونریزی یا خارج شدن این لوله نیاز به همکاری شما در رعایت موارد ذیل را داریم :

- محل کاتتر حتی الامکان هفته ای سه بار پانسمان شود .

- در صورت داشتن کاتتر دائم ، تعویض پانسمان باید تا مدت ۶-۸ هفته انجام گیرد و پس از آن نیازی به وجود پانسمان نمی باشد .

- به هنگام حمام کردن روی پانسمان و لوله ها را با پلاستیک پوشانده و بعد سرو بدن را جداگانه بشوئید . (مراقب باشید محل ورود لوله ها در گردن خیس نشود)



- در صورت داشتن کاتتر دائم پس از ۸ هفته میتوانید به راحتی حمام کنید و بهتر است پس از حمام ، محل کاتتر دائم را با سشوار خشک کنید .

- در صورت بروز هر گونه تحریک و خارش در محل بخیه ها به هیچ عنوان به آن دست نزنید .
- مراقب تاشدگی و یا خمیدگی لوله ها باشید و با آن ها بازی نکنید و سر پوش لوله ها را باز نکنید .
- از وارد کردن ضربه و یا ایجاد کشش بر روی لوله ها جلوگیری کنید .
- با استفاده از ثابت کننده های لوله های کاتتر مانند سرجی فیکس روی پانسمان گردن ، از حرکت های بی مورد لوله ها جلوگیری کنید .

