




بیمارستان و دارالشفای حضرت زهرا (س) مرضیه (س)

پیوند یا گرافت شریانی - وریدی

تاریخ بازنگری: مهر ماه ۱۳۹۶



- در صورت خونریزی از محل سوزن مراقب باشید اطرافیان خود را آلوده نکنید.

- در صورت ریخته شدن خون بر روی دیوار یا کف اتاق، وایتکس رقیق شده روی آن بریزید و پس از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه محل آلودگی را با آب ساده شستشو دهید.



*کانال تلگرام بیمارستان :
@zahrayemarziye

- محل تزریق سوزن را از لحاظ خونریزی کنترل کنید.

- علائم و نشانه های عفونت محل سوزن (قرمزی ، تورم ، درد و...) را کنترل کنید.

- به هیچ وجه با عضوگرافت شده وزنه سنگین بلند نکنید . روی عضوگرافت شده نخوابید .

- بعد از انجام دیالیز به مدت هشت ساعت از دوش گرفتن و برداشتن پانسمان محل گرافت خودداری کنید .

آیا میدانید گرافت شریانی - وریدی

چیست؟

گرافت یک رگ مصنوعی است که به علت نداشتن رگ مناسب به جای فیستول جهت دیالیز توسط جراح گذاشته میشود.

همچنین ممکن است از گرافت برای ترمیم عروق در نارسایی عروقی بیماران دیابتی استفاده شود.

آیا می دانید گرافت را در چه محل

هایی قرار می دهند؟

ساعد، بالای بازو یا بالای ران

عوارض گرافت:

شایع ترین عوارض گرافت ها عفونت،
لخته یا ترومبوز می باشد.

آیا میدانید چه موقع گرافت شما برای

انجام دیالیز آماده است؟

زمان آمادگی گرافت جهت انجام دیالیز،
دو هفته پس از گذاشتن رگ مصنوعی
می باشد.



توجه:

- هیچگاه اجازه ندهید از عضو دارای گرافت فشارخون گرفته شود.
- اجازه تزریق روی عضو گرافت دار ندهید.
- روزانه ۴ بار محل گرافت خود را لمس و از کارایی آن اطمینان حاصل کنید.
- روزانه نبض پا و دست را لمس کنید.
- بعد از جراحی، عضوی را که گرافت شده بالا نگه دارید.
- روزانه عضوی را که گرافت شده حرکت و ورزش دهید.