




بیمارستان و دارالشفای حضرت زهرا (س) مرضیه (س)


سرطان اندومتر

تاریخ بازنگری: مهر ماه ۱۳۹۶



درمان

مرسوم ترین گزینه برای درمان سرطان مخاط رحم هیستریکتومی شکمی (برداشتن کامل رحم با جراحی)، همراه با برداشتن لوله رحم و تخمدانها از هر دو سو است که به آن سالپینگو اوفورکتومی دو طرفه گفته می شود. در موارد پیشرفته پرتودرمانی، شیمی درمانی یا هورمون درمانی نیز می تواند توصیه شود. اگر بیماری در مرحله زود تشخیص داده شود، نتیجه رضایت بخش خواهد بود.



*کانال تلگرام بیمارستان: @zahrayemarziye

تشخیص سرطان آندومتر یا سرطان رحم

- آزمون لگن: پزشک دستگاهی به نام اسپکولوم (speculum) را وارد واژن می کند. اسپکولوم واژن را باز می کند و پزشک می تواند واژن و سرویکس یا دهانه رحم را معاینه نماید تا وجود عوامل و بافت غیر طبیعی را بررسی کند.
- استفاده از امواج صوتی برای ایجاد تصویری از رحم: پزشک ممکن است به شما اولتراسوند ترانس واژینال را توصیه کند تا ضخامت و بافت آندومتریوم یا لایه آندومتر و سایر شرایط را بررسی نماید. این تست به پزشک کمک خواهد کرد تا بتواند اختلالات در بافت دیواره رحم را جست و جو و شناسایی نماید.
- استفاده از اسکوپ برای بررسی بافت آندومتریوم یا آندومتر (هیسترسکوپی)
- نمونه برداری ساده و در صورت عدم موفقیت بیوپسی ساده، استفاده از کورتاژ

سرطان آندومتر ، نوعی سرطان است که در رحم ایجاد می شود . رحم ، ارگانی توخالی و گلابی شکل است که در لگن قرار دارد و محلی است که در آن رشد جنین اتفاق می افتد .

سرطان آندومتر یا سرطان رحم، اغلب در مراحل اولیه قابل تشخیص است و با خونریزی های غیر طبیعی واژن همراه است و به واسطه همین خونریزی غیر طبیعی ، بیمار به پزشک مراجعه می کند . اگر سرطان آندومتر به موقع تشخیص داده شود از طریق جراحی رحم برداشته می شود .

فاکتورهای خطر در سرطان آندومتر یا سرطان رحم :

- تغییر در تعادل هورمون های زنانه در بدن :
- بیماری یا شرایطی در بدن که منجر به افزایش استروژن شود اما سطح پروژسترون را تغییری ندهد ، می تواند احتمال بروز سرطان آندومتر را افزایش دهد ، از جمله شرایطی مانند الگوی تخمک گذاری غیر طبیعی که در زنانی با مشکل سندرم تخمدان پلی کیستیک ، چاقی

و دیابت اتفاق می افتد . مصرف هورمون ها (که حاوی استروژن و بدون پروژسترون باشد) بعد از دوره یائسگی نیز می تواند احتمال بروز سرطان آندومتر را افزایش دهد .

- سال های قاعدگی : شروع قاعدگی قبل از ۱۲ سالگی یا دیر یائسه شدن ، می تواند احتمال بروز سرطان آندومتر را افزایش دهد .
- هرگز باردار نشدن : زنانی که هرگز باردار نشده اند در مقایسه با زنانی که حداقل یک بار باردار شده اند ، بیشتر در معرض ریسک سرطان آندومتر یا سرطان رحم هستند .

• افزایش سن

- چاقی : افزایش توده چربی تعادل هورمونی بدن را تغییر می دهد .

- هورمون درمانی برای سرطان سینه : زنان مبتلا



به سرطان سینه که با داروهایی مانند ، تاموکسیفن تحت هورمون درمانی قرار دارند در خطر ابتلا به سرطان آندومتر یا رحم هستند .

علائم سرطان آندومتر یا سرطان رحم :

۱. خونریزی واژینال بعد از دوره یائسگی
۲. خونریزی بین دوره های قاعدگی
۳. ترشح مایعاتی آبکی، غیر طبیعی و تیره رنگ (به رنگ خون) از واژن
۴. درد لگن
۵. درد به هنگام نزدیکی جنسی

چه وقت باید به دکتر مراجعه کرد ؟

اگر علامت و عارضه ای مانند : خونریزی واژینال و ترشح مایعاتی که به دوره قاعدگی شما مربوط نیست ، درد لگن یا درد به هنگام نزدیکی جنسی را تجربه کرده اید که باعث نگرانی شما شده ، از پزشک خود وقت ملاقات بگیرید .