



بیمارستان و دارالشفای حضرت زهرا (س) مرضیه (س)

سقط فراموش شده

تاریخ بازنگری: مهر ماه ۱۳۹۶



شامل درمان جراحی و طبی می باشد ؛
که درمان طبی به دلیل داشتن عوارض
کمتر و عدم نیاز به بیهوشی نسبت به
درمان جراحی ارجحیت دارد .

در سقط جنین با دارو ، داروها با ایجاد
انقباضات شدید رحمی باعث خونریزی و
ختم بارداری می شوند . خونریزی ایجاد
شده به دنبال سقط دارویی معمولاً ۹ تا
۱۶ روز ادامه دارد .

گاه علائمی نظیر تهوع ، استفراغ ، اسهال
، تب و لرز و خستگی شدید طی این
مدت در بیمار ظاهر می شود که
خودبه خود از بین می رود .

پس از سپری شدن این زمان ، معاینه و
بررسی های کامل لازم است تا اطمینان
حاصل شود که سقط کامل صورت
گرفته است . در تعداد بسیار کمی از
زنان ، روش سقط دارویی به سقط
نمی انجامد و نیاز به انجام اقدامات
دیگری است . داروی میزوپروستول از
رژیم های درمانی طبی جدیدی است
که مورد تایید بوده و در مورد کارآیی و
عوارض جانبی آن نظرات متفاوتی وجود
دارد . لذا در مورد درمان خود حتماً با
پزشک متخصص خود مشورت نمایید .

*کانال تلگرام بیمارستان : @zahrayemarziye

سقط فراموش شده چیست ؟

این بدان معناست که جنین وجود دارد اما در سونوگرافی جنین دارای ضربان قلب نمی باشد و شواهدی به نفع ادامه حاملگی وجود ندارد. سقط فراموش شده توسط سونوگرافی با علائم متفاوتی تشخیص داده نمی شود. علائم و شواهد سقط فراموش شده با استفاده از اسکن سونوگرافی داخلی ترانس واژینال (TVS) با کیفیت بالا انجام می گیرد. در این نوع سقط رشد جنین داخل رحم متوقف شده، ولی دهانه رحم کاملاً بسته است و لکه بینی و خونریزی وجود ندارد.

علائم سقط فراموش شده :

- عدم حضور رشد ساک حاملگی یا قطب جنینی در طی ۵ روز
- ساک حاملگی با قطر بیش از ۱۲ میلی متر (در حدود ۵ هفته و ۵روز) بدون شواهدی از کیسه زرده
- عدم وجود ضربان قلب جنین زمانی که طول سری (CRL) بیش از ۵ میلی متر باشد.
- کیسه زرده بزرگتر از ابعاد ۶ میلی متر باشد.
- عدم وجود فعالیت قلب جنین،

خصوصاً اگر قبلاً ضربان قلب جنین وجود داشته باشد.

- کیسه زرده به طور غیر طبیعی شکل گرفته است.

عوارض این نوع سقط :

سقط فراموش شده در صورت عدم مداخله درمانی می تواند پیامدهای ناگواری نظیر اختلالات انعقادی، عفونت، خونریزی های شدید، شوک و حتی مرگ مادر را در پی داشته باشد.

درمان سقط فراموش شده :

درمان های رایج سقط فراموش شده